

Kürzel: **KRAN** Name der Indikator-OP-Art: **Kraniotomie**

Beschreibung: Offen chirurgische Eingriffe an erkranktem intrakraniellen Gewebe.  
**Der Zugang zum Operationsgebiet erfolgt über eine Kraniotomie.** Diese kann unter Umständen in Kombination mit weiteren Zugangswegen (z.B. Kraniotomie + Bohrloch) durchgeführt werden. **Eingriffe ohne Kraniotomie werden nicht erfasst.**

### Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2024)

- 5-015.0-5 Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellen Gewebe
- 5-013.1 Entleerung eines subduralen Hämatoms
- 5-013.3 Drainage intrazerebraler Flüssigkeit
- 5-013.4 Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms

Obige Codes enthalten noch keine Angabe über den Zugang zum Operationsgebiet.

**Es muss zusätzlich der Zugang über 5-010.0\_ (Kraniotomie) codiert sein.**

### Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Verwendung eines Implantats: Ja/Nein/Unbekannt
- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls

#### Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:

- 1 (aseptisch): → Normalfall
- 2 (bedingt aseptisch) → bei dieser OP werden in der Regel weder Respirations- noch Urogenital-, noch Gastrointestinaltrakt eröffnet
- 3 (kontaminiert) → frische, offene Fraktur
- 4 (septisch-infiziert) → z.B. intrakranielle Empyeme /Abszesse

### Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 90 Tage

### Erfassung der Infektionen:

#### Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen:

- A1 (oberflächliche post-op. WI):
- nur oberflächliche Infektion (subkutan)
- A2 (tiefe post-op. WI):
- tiefe Wundinfektion (bis unter den Knochendeckel, auch epidural)
- A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):
- als „Organ“ wird das Gehirn angesehen, als Körperhöhle ist der Raum unterhalb der Dura mater zu betrachten
  - z.B. subduraler Abszess, Arachnoidalabszess, intrakranieller Abszess / Empyem, Meningitis