

gültig ab: 01.01.2025

Kürzel: **PARO** Name der Indikator-OP-Art: **Parotidektomie**

### Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2025)

5-262.0	Parotidektomie, partiell
5-262.1	Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis
5-262.2	Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis
5-262.3	Parotidektomie, komplett mit Resektion und Rekonstruktion des N. facialis

### Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls  
Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:
  - 1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Speicheldrüsenausführungsganges nicht möglich
  - 2 (bedingt aseptisch) → Normalfall (z.B. bei Speichelstein oder Tumor), sofern die Parotis nicht entzündet ist
  - 3 (kontaminiert)
    - frische offene Verletzung
  - 4 (septisch-infiziert)
    - akute eitrige Entzündung im OP-Gebiet
- weitere Parameter siehe OP-KISS Protokoll

**Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage**

### Erfassung von Infektionen:

#### A1 Postoperative oberflächliche Wundinfektion

- Infektion der oberflächlichen Hautinzision

#### A2 Postoperative tiefe Wundinfektion

- Infektion der tiefen Inzision

#### A3 Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet

- Infektion von Organen in der Parotisgegend, z.B. Restparotis