

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS Referenzdaten

Stratifizierung: Stationen ohne Aufnahmescreening

Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

Erstellungsdatum: 16.Juni 2021

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | ALLE | | |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 60 |
| Anzahl Patienten: | 6.763 | Anzahl Patiententage: | 24.755 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,67 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 5 | 41,67 |
| MRSA | Kolonisationen | 7 | 58,33 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 12 | 6.763 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 6.763 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.763 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 24.755 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 6.763 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 24.755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 6.763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 24.755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | ALLE | | |
| Anzahl Stationen: | 84 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 3.150 |
| Anzahl Patienten: | 256.469 | Anzahl Patiententage: | 903.012 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 1.052 | 639 | 60,74 | 413 | 39,26 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 355 | 33,75 |
| VRE | Kolonisationen | 689 | 65,49 |
| VRE | Unbekannt | 8 | 0,76 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.052 | 256.469 | 0,41 | 0,02 | 0,26 | 0,52 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 639 | 256.469 | 0,25 | 0,00 | 0,13 | 0,32 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 413 | 256.469 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,29 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 413 | 903.012 | 0,46 | 0,00 | 0,21 | 0,70 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 355 | 256.469 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,22 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 133 | 903.012 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 133 | 256.469 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 126 | 903.012 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | ALLE | | |
| Anzahl Stationen: | 36 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.458 |
| Anzahl Patienten: | 119.309 | Anzahl Patiententage: | 398.765 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 1.219 | 933 | 76,54 | 286 | 23,46 |
| 3MRGN | 1.133 | 881 | 77,76 | 252 | 22,24 |
| 4MRGN | 86 | 52 | 60,47 | 34 | 39,53 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 515 | 42,25 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 700 | 57,42 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 4 | 0,33 |
| 3MRGN | Infektionen | 477 | 42,10 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 653 | 57,63 |
| 3MRGN | Unbekannt | 3 | 0,26 |
| 4MRGN | Infektionen | 38 | 44,19 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 47 | 54,65 |
| 4MRGN | Unbekannt | 1 | 1,16 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.219 | 119.309 | 1,02 | 0,23 | 0,68 | 1,54 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 933 | 119.309 | 0,78 | 0,14 | 0,47 | 1,22 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 286 | 119.309 | 0,24 | 0,07 | 0,15 | 0,33 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 286 | 398.765 | 0,72 | 0,27 | 0,46 | 1,03 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 515 | 119.309 | 0,43 | 0,15 | 0,24 | 0,64 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 117 | 398.765 | 0,29 | 0,08 | 0,23 | 0,36 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 117 | 119.309 | 0,10 | 0,02 | 0,07 | 0,14 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 106 | 398.765 | 0,27 | 0,07 | 0,18 | 0,35 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1.133 | 119.309 | 0,95 | 0,20 | 0,66 | 1,47 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 881 | 119.309 | 0,74 | 0,11 | 0,44 | 1,17 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 252 | 119.309 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,30 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 252 | 398.765 | 0,63 | 0,18 | 0,42 | 0,85 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 477 | 119.309 | 0,40 | 0,13 | 0,21 | 0,60 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 102 | 398.765 | 0,26 | 0,00 | 0,19 | 0,35 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 102 | 119.309 | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 94 | 398.765 | 0,24 | 0,00 | 0,13 | 0,32 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 86 | 119.309 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 52 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 34 | 119.309 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 34 | 398.765 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 38 | 119.309 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 398.765 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 15 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 12 | 398.765 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 233 | 119.309 | 0,20 | 0,03 | 0,12 | 0,26 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 182 | 119.309 | 0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,17 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 51 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 51 | 398.765 | 0,13 | 0,00 | 0,08 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 88 | 119.309 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 21 | 398.765 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 21 | 119.309 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 398.765 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 227 | 119.309 | 0,19 | 0,03 | 0,12 | 0,25 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 178 | 119.309 | 0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,17 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 49 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 49 | 398.765 | 0,12 | 0,00 | 0,08 | 0,18 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 88 | 119.309 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 21 | 398.765 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 21 | 119.309 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 398.765 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 6 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 398.765 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 641 | 119.309 | 0,54 | 0,12 | 0,43 | 0,81 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 525 | 119.309 | 0,44 | 0,08 | 0,30 | 0,72 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 116 | 119.309 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 116 | 398.765 | 0,29 | 0,00 | 0,18 | 0,36 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 292 | 119.309 | 0,24 | 0,03 | 0,15 | 0,37 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 51 | 398.765 | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 51 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 48 | 398.765 | 0,12 | 0,00 | 0,05 | 0,13 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 637 | 119.309 | 0,53 | 0,12 | 0,43 | 0,81 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 522 | 119.309 | 0,44 | 0,08 | 0,30 | 0,72 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 115 | 119.309 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 115 | 398.765 | 0,29 | 0,00 | 0,18 | 0,36 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 291 | 119.309 | 0,24 | 0,03 | 0,13 | 0,37 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 51 | 398.765 | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 51 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 48 | 398.765 | 0,12 | 0,00 | 0,05 | 0,13 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 48 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 30 | 119.309 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 18 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 18 | 398.765 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 17 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 398.765 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 398.765 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 45 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 28 | 119.309 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 17 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 17 | 398.765 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 15 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 398.765 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 398.765 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 398.765 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 12 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 398.765 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 119.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 398.765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5 Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 165 | 119.309 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 95 | 119.309 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 70 | 119.309 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 70 | 398.765 | 0,18 | 0,00 | 0,11 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 74 | 119.309 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 25 | 398.765 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 25 | 119.309 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 22 | 398.765 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 101 | 119.309 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,11 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 57 | 119.309 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 44 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 44 | 398.765 | 0,11 | 0,00 | 0,07 | 0,14 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 44 | 119.309 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 398.765 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 15 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14 | 398.765 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 64 | 119.309 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 38 | 119.309 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 26 | 119.309 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 26 | 398.765 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 30 | 119.309 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 398.765 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 10 | 119.309 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 398.765 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 1.629 |
| Anzahl Stationen: | 41 | Anzahl Patiententage: | 381.056 |
| Anzahl Patienten: | 129.394 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 312 | 165 | 52,88 | 147 | 47,12 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 116 | 37,18 |
| VRE | Kolonisationen | 191 | 61,22 |
| VRE | Unbekannt | 5 | 1,60 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 312 | 129.394 | 0,24 | 0,00 | 0,13 | 0,45 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 165 | 129.394 | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,20 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 147 | 129.394 | 0,11 | 0,00 | 0,05 | 0,21 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 147 | 381.056 | 0,39 | 0,00 | 0,16 | 0,60 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 116 | 129.394 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,12 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 41 | 381.056 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 41 | 129.394 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 39 | 381.056 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN < 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 539 |
| Anzahl Stationen: | 12 | Anzahl Patiententage: | 126.703 |
| Anzahl Patienten: | 44.440 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 339 | 273 | 80,53 | 66 | 19,47 |
| 3MRGN | 311 | 251 | 80,71 | 60 | 19,29 |
| 4MRGN | 28 | 22 | 78,57 | 6 | 21,43 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 137 | 40,41 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 199 | 58,70 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 3 | 0,88 |
| 3MRGN | Infektionen | 130 | 41,80 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 179 | 57,56 |
| 3MRGN | Unbekannt | 2 | 0,64 |
| 4MRGN | Infektionen | 7 | 25,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 20 | 71,43 |
| 4MRGN | Unbekannt | 1 | 3,57 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 339 | 44.440 | 0,76 | 0,22 | 0,50 | 0,83 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 273 | 44.440 | 0,61 | 0,16 | 0,35 | 0,61 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 66 | 44.440 | 0,15 | 0,07 | 0,13 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 66 | 126.703 | 0,52 | 0,27 | 0,49 | 0,58 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 137 | 44.440 | 0,31 | 0,11 | 0,19 | 0,47 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 21 | 126.703 | 0,17 | 0,07 | 0,19 | 0,28 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 21 | 44.440 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 21 | 126.703 | 0,17 | 0,07 | 0,19 | 0,28 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 311 | 44.440 | 0,70 | 0,20 | 0,47 | 0,78 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 251 | 44.440 | 0,56 | 0,14 | 0,34 | 0,56 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 60 | 44.440 | 0,14 | 0,05 | 0,13 | 0,20 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 60 | 126.703 | 0,47 | 0,19 | 0,48 | 0,56 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 130 | 44.440 | 0,29 | 0,09 | 0,19 | 0,45 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 19 | 126.703 | 0,15 | 0,03 | 0,12 | 0,24 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 19 | 44.440 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 19 | 126.703 | 0,15 | 0,03 | 0,12 | 0,24 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 28 | 44.440 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 22 | 44.440 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 126.703 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 7 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 126.703 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 126.703 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 126.703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 126.703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 126.703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 74 | 44.440 | 0,17 | 0,03 | 0,07 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 65 | 44.440 | 0,15 | 0,00 | 0,06 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 126.703 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 29 | 44.440 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 126.703 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 126.703 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 71 | 44.440 | 0,16 | 0,03 | 0,07 | 0,21 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 62 | 44.440 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 126.703 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 29 | 44.440 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 126.703 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 126.703 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 164 | 44.440 | 0,37 | 0,11 | 0,27 | 0,48 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 137 | 44.440 | 0,31 | 0,10 | 0,21 | 0,36 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 27 | 44.440 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 27 | 126.703 | 0,21 | 0,04 | 0,16 | 0,32 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 77 | 44.440 | 0,17 | 0,03 | 0,11 | 0,24 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 126.703 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 126.703 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,15 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 161 | 44.440 | 0,36 | 0,11 | 0,27 | 0,48 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 135 | 44.440 | 0,30 | 0,10 | 0,21 | 0,36 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 26 | 44.440 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 26 | 126.703 | 0,21 | 0,03 | 0,16 | 0,32 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 77 | 44.440 | 0,17 | 0,03 | 0,11 | 0,24 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 126.703 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 126.703 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,15 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 126.703 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|---|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 126.703 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 44.440 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 126.703 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|---|---|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 126.703 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 126.703 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5 Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 52 | 44.440 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 32 | 44.440 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 20 | 44.440 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 20 | 126.703 | 0,16 | 0,04 | 0,13 | 0,25 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 20 | 44.440 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 126.703 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 126.703 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 32 | 44.440 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 44.440 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 16 | 44.440 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 16 | 126.703 | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,20 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 14 | 44.440 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 126.703 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 126.703 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 20 | 44.440 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 44.440 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 126.703 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 44.440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 126.703 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 44.440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 126.703 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 503 |
| Anzahl Stationen: | 11 | Anzahl Patiententage: | 224.154 |
| Anzahl Patienten: | 48.747 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 510 | 354 | 69,41 | 156 | 30,59 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 164 | 32,16 |
| VRE | Kolonisationen | 345 | 67,65 |
| VRE | Unbekannt | 1 | 0,20 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 510 | 48.747 | 1,05 | 0,31 | 0,70 | 2,00 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 354 | 48.747 | 0,73 | 0,15 | 0,38 | 0,89 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 156 | 48.747 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,50 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 156 | 224.154 | 0,70 | 0,33 | 0,64 | 0,88 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 164 | 48.747 | 0,34 | 0,13 | 0,15 | 0,58 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 57 | 224.154 | 0,25 | 0,07 | 0,22 | 0,31 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 57 | 48.747 | 0,12 | 0,02 | 0,08 | 0,18 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 54 | 224.154 | 0,24 | 0,04 | 0,16 | 0,31 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | INTERDISZIPLINÄR (BETTEN >= 400) | Anzahl Beobachtungsmonate: | 141 |
| Anzahl Stationen: | 6 | Anzahl Patiententage: | 53.913 |
| Anzahl Patienten: | 14.283 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 160 | 112 | 70,00 | 48 | 30,00 |
| 3MRGN | 151 | 106 | 70,20 | 45 | 29,80 |
| 4MRGN | 9 | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 71 | 44,38 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 89 | 55,62 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 66 | 43,71 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 85 | 56,29 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 5 | 55,56 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 4 | 44,44 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 160 | 14.283 | 1,12 | 0,00 | 1,05 | 1,65 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 112 | 14.283 | 0,78 | 0,00 | 0,75 | 1,05 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 48 | 14.283 | 0,34 | 0,00 | 0,30 | 0,59 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 48 | 53.913 | 0,89 | 0,00 | 0,74 | 1,23 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 71 | 14.283 | 0,50 | 0,00 | 0,40 | 1,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 13 | 53.913 | 0,24 | 0,00 | 0,15 | 0,26 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 13 | 14.283 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,09 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 12 | 53.913 | 0,22 | 0,00 | 0,15 | 0,22 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 151 | 14.283 | 1,06 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 106 | 14.283 | 0,74 | 0,00 | 0,69 | 1,01 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 45 | 14.283 | 0,32 | 0,00 | 0,29 | 0,52 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 45 | 53.913 | 0,83 | 0,00 | 0,73 | 1,17 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 66 | 14.283 | 0,46 | 0,00 | 0,36 | 1,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 53.913 | 0,20 | 0,00 | 0,05 | 0,22 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 14.283 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 53.913 | 0,19 | 0,00 | 0,05 | 0,19 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 14.283 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,15 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 14.283 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 14.283 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 53.913 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 14.283 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 53.913 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 53.913 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 14.283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 14.283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 14.283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 53.913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 14.283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 53.913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 14.283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 53.913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 41 | 14.283 | 0,29 | 0,00 | 0,21 | 0,41 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 30 | 14.283 | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 11 | 14.283 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 11 | 53.913 | 0,20 | 0,00 | 0,13 | 0,39 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 19 | 14.283 | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 53.913 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 14.283 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 53.913 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 40 | 14.283 | 0,28 | 0,00 | 0,21 | 0,40 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 30 | 14.283 | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 10 | 14.283 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 10 | 53.913 | 0,19 | 0,00 | 0,11 | 0,39 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 19 | 14.283 | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 53.913 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 14.283 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 53.913 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 71 | 14.283 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,74 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 52 | 14.283 | 0,36 | 0,00 | 0,34 | 0,45 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 19 | 14.283 | 0,13 | 0,00 | 0,15 | 0,30 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 19 | 53.913 | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,59 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 30 | 14.283 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 0,59 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 53.913 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 14.283 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 53.913 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 71 | 14.283 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,74 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 52 | 14.283 | 0,36 | 0,00 | 0,34 | 0,45 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 19 | 14.283 | 0,13 | 0,00 | 0,15 | 0,30 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 19 | 53.913 | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,59 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 30 | 14.283 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 0,59 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 53.913 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 14.283 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|----------------|--|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 53.913 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 14.283 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 8 | 14.283 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 8 | 53.913 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 14.283 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 53.913 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 14.283 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 53.913 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 9 | 14.283 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 14.283 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 53.913 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 14.283 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 53.913 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 2 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 53.913 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5 Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 23 | 14.283 | 0,16 | 0,00 | 0,10 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 16 | 14.283 | 0,11 | 0,00 | 0,07 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 7 | 14.283 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 7 | 53.913 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 10 | 14.283 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 16 | 14.283 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,17 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 14.283 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 6 | 14.283 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 6 | 53.913 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 14.283 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 7 | 14.283 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,07 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 14.283 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 14.283 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 14.283 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 53.913 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 320 |
| Anzahl Stationen: | 11 | Anzahl Patiententage: | 83.415 |
| Anzahl Patienten: | 24.789 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 71 | 33 | 46,48 | 38 | 53,52 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 16 | 22,54 |
| VRE | Kolonisationen | 55 | 77,46 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 71 | 24.789 | 0,29 | 0,02 | 0,18 | 1,61 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 33 | 24.789 | 0,13 | 0,02 | 0,10 | 0,69 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 38 | 24.789 | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,92 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 38 | 83.415 | 0,46 | 0,00 | 0,20 | 1,72 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 16 | 24.789 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,31 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 83.415 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 8 | 24.789 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 83.415 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | INTERNISTISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 282 |
| Anzahl Stationen: | 7 | Anzahl Patiententage: | 75.477 |
| Anzahl Patienten: | 20.708 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 315 | 252 | 80,00 | 63 | 20,00 |
| 3MRGN | 297 | 246 | 82,83 | 51 | 17,17 |
| 4MRGN | 18 | 6 | 33,33 | 12 | 66,67 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 104 | 33,02 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 210 | 66,67 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 1 | 0,32 |
| 3MRGN | Infektionen | 94 | 31,65 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 202 | 68,01 |
| 3MRGN | Unbekannt | 1 | 0,34 |
| 4MRGN | Infektionen | 10 | 55,56 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 8 | 44,44 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 315 | 20.708 | 1,52 | 0,64 | 1,52 | 3,08 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 252 | 20.708 | 1,22 | 0,55 | 1,24 | 2,20 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 63 | 20.708 | 0,30 | 0,00 | 0,28 | 0,88 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 63 | 75.477 | 0,83 | 0,00 | 0,73 | 1,14 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 104 | 20.708 | 0,50 | 0,18 | 0,56 | 0,97 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 18 | 75.477 | 0,24 | 0,09 | 0,33 | 0,44 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 18 | 20.708 | 0,09 | 0,02 | 0,13 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14 | 75.477 | 0,19 | 0,00 | 0,13 | 0,43 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 297 | 20.708 | 1,43 | 0,62 | 1,50 | 3,08 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 246 | 20.708 | 1,19 | 0,55 | 1,24 | 2,20 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 51 | 20.708 | 0,25 | 0,00 | 0,23 | 0,67 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 51 | 75.477 | 0,68 | 0,00 | 0,67 | 1,14 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 94 | 20.708 | 0,45 | 0,18 | 0,51 | 0,79 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 17 | 75.477 | 0,23 | 0,09 | 0,33 | 0,44 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 17 | 20.708 | 0,08 | 0,02 | 0,13 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 13 | 75.477 | 0,17 | 0,00 | 0,13 | 0,37 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 18 | 20.708 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,14 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 20.708 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 20.708 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 75.477 | 0,16 | 0,00 | 0,07 | 0,19 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 10 | 20.708 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 75.477 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 75.477 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 75.477 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 69 | 20.708 | 0,33 | 0,12 | 0,22 | 0,43 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 52 | 20.708 | 0,25 | 0,09 | 0,22 | 0,35 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 17 | 20.708 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 17 | 75.477 | 0,23 | 0,00 | 0,09 | 0,33 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 19 | 20.708 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 75.477 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 20.708 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 75.477 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 69 | 20.708 | 0,33 | 0,12 | 0,22 | 0,43 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 52 | 20.708 | 0,25 | 0,09 | 0,22 | 0,35 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 17 | 20.708 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 17 | 75.477 | 0,23 | 0,00 | 0,09 | 0,33 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 19 | 20.708 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 75.477 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 20.708 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 75.477 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 167 | 20.708 | 0,81 | 0,43 | 0,78 | 1,87 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 148 | 20.708 | 0,71 | 0,38 | 0,70 | 1,32 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 19 | 20.708 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 19 | 75.477 | 0,25 | 0,00 | 0,20 | 0,32 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 60 | 20.708 | 0,29 | 0,00 | 0,37 | 0,42 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 75.477 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 20.708 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 75.477 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,09 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 167 | 20.708 | 0,81 | 0,43 | 0,78 | 1,87 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 148 | 20.708 | 0,71 | 0,38 | 0,70 | 1,32 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 19 | 20.708 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 19 | 75.477 | 0,25 | 0,00 | 0,20 | 0,32 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 60 | 20.708 | 0,29 | 0,00 | 0,37 | 0,42 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 75.477 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,13 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 6 | 20.708 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 75.477 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,09 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 20.708 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 20.708 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 20.708 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 75.477 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 20.708 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 20.708 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 20.708 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 20.708 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 75.477 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 20.708 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|----------------|--|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 20.708 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5 Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 29 | 20.708 | 0,14 | 0,05 | 0,17 | 0,53 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 15 | 20.708 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,53 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 14 | 20.708 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 14 | 75.477 | 0,19 | 0,00 | 0,07 | 0,32 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 15 | 20.708 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 75.477 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 20.708 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 75.477 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 20.708 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,53 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 20.708 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,53 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 20.708 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 75.477 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 20.708 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 75.477 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 20.708 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 75.477 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 16 | 20.708 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,12 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 20.708 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 11 | 20.708 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 11 | 75.477 | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,19 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 10 | 20.708 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 20.708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 75.477 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 398 |
| Anzahl Stationen: | 11 | Anzahl Patiententage: | 121.911 |
| Anzahl Patienten: | 35.106 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 77 | 40 | 51,95 | 37 | 48,05 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 38 | 49,35 |
| VRE | Kolonisationen | 38 | 49,35 |
| VRE | Unbekannt | 1 | 1,30 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 77 | 35.106 | 0,22 | 0,00 | 0,26 | 0,34 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 40 | 35.106 | 0,11 | 0,00 | 0,14 | 0,22 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 37 | 35.106 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,16 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 37 | 121.911 | 0,30 | 0,00 | 0,13 | 0,47 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 38 | 35.106 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,22 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 15 | 121.911 | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,24 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 15 | 35.106 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 14 | 121.911 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Art der Station: | CHIRURGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 8 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 381 |
| Anzahl Patienten: | 29.648 | Anzahl Patiententage: | 101.303 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 342 | 246 | 71,93 | 96 | 28,07 |
| 3MRGN | 319 | 233 | 73,04 | 86 | 26,96 |
| 4MRGN | 23 | 13 | 56,52 | 10 | 43,48 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 183 | 53,51 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 159 | 46,49 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 172 | 53,92 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 147 | 46,08 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 11 | 47,83 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 12 | 52,17 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 342 | 29.648 | 1,15 | 0,33 | 0,92 | 1,58 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 246 | 29.648 | 0,83 | 0,21 | 0,65 | 1,27 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 96 | 29.648 | 0,32 | 0,12 | 0,19 | 0,40 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 96 | 101.303 | 0,95 | 0,35 | 0,57 | 1,13 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 183 | 29.648 | 0,62 | 0,17 | 0,34 | 0,64 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 53 | 101.303 | 0,52 | 0,11 | 0,33 | 0,53 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 53 | 29.648 | 0,18 | 0,04 | 0,11 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 49 | 101.303 | 0,48 | 0,11 | 0,33 | 0,46 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 319 | 29.648 | 1,08 | 0,32 | 0,87 | 1,45 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 233 | 29.648 | 0,79 | 0,21 | 0,62 | 1,19 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 86 | 29.648 | 0,29 | 0,08 | 0,17 | 0,36 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 86 | 101.303 | 0,85 | 0,24 | 0,52 | 1,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 172 | 29.648 | 0,58 | 0,15 | 0,32 | 0,59 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 48 | 101.303 | 0,47 | 0,07 | 0,33 | 0,44 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 48 | 29.648 | 0,16 | 0,02 | 0,11 | 0,16 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 45 | 101.303 | 0,44 | 0,07 | 0,33 | 0,40 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 23 | 29.648 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 13 | 29.648 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 10 | 29.648 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 10 | 101.303 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,12 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 11 | 29.648 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 101.303 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 29.648 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 101.303 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 101.303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 101.303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 101.303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Klebsiella pneumoniae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 44 | 29.648 | 0,15 | 0,06 | 0,17 | 0,21 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 30 | 29.648 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 14 | 29.648 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 14 | 101.303 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 21 | 29.648 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 101.303 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,14 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 8 | 29.648 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 101.303 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,14 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 42 | 29.648 | 0,14 | 0,06 | 0,15 | 0,21 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 29 | 29.648 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 13 | 29.648 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 13 | 101.303 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,19 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 21 | 29.648 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 101.303 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,14 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 8 | 29.648 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 8 | 101.303 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,14 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 101.303 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 205 | 29.648 | 0,69 | 0,11 | 0,51 | 0,93 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 160 | 29.648 | 0,54 | 0,11 | 0,39 | 0,84 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 45 | 29.648 | 0,15 | 0,00 | 0,05 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 45 | 101.303 | 0,44 | 0,00 | 0,16 | 0,44 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 115 | 29.648 | 0,39 | 0,02 | 0,19 | 0,33 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 26 | 101.303 | 0,26 | 0,00 | 0,07 | 0,17 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 26 | 29.648 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 24 | 101.303 | 0,24 | 0,00 | 0,06 | 0,15 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 204 | 29.648 | 0,69 | 0,11 | 0,49 | 0,93 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 159 | 29.648 | 0,54 | 0,11 | 0,37 | 0,84 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 45 | 29.648 | 0,15 | 0,00 | 0,05 | 0,16 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 45 | 101.303 | 0,44 | 0,00 | 0,16 | 0,44 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 114 | 29.648 | 0,38 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 26 | 101.303 | 0,26 | 0,00 | 0,07 | 0,17 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 26 | 29.648 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 24 | 101.303 | 0,24 | 0,00 | 0,06 | 0,15 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 13 | 29.648 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 29.648 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 101.303 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 6 | 29.648 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 101.303 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 101.303 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 12 | 29.648 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 8 | 29.648 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 4 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 4 | 101.303 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 29.648 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 101.303 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 101.303 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 29.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5 Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 50 | 29.648 | 0,17 | 0,06 | 0,09 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 24 | 29.648 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 26 | 29.648 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 26 | 101.303 | 0,26 | 0,12 | 0,16 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 25 | 29.648 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,13 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 101.303 | 0,11 | 0,00 | 0,07 | 0,19 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 11 | 29.648 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 11 | 101.303 | 0,11 | 0,00 | 0,07 | 0,19 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 34 | 29.648 | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,11 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 17 | 29.648 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 17 | 29.648 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 17 | 101.303 | 0,17 | 0,04 | 0,11 | 0,19 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 18 | 29.648 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 101.303 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 29.648 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|---------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 101.303 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 16 | 29.648 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 7 | 29.648 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 29.648 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 101.303 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,10 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 7 | 29.648 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 101.303 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 29.648 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 101.303 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 48 |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Patiententage: | 13.794 |
| Anzahl Patienten: | 2.778 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 12 | 11 | 91,67 | 1 | 8,33 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| VRE | Kolonisationen | 12 | 100,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 12 | 2.778 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 11 | 2.778 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 13.794 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | NEUROCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 48 |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Patiententage: | 13.794 |
| Anzahl Patienten: | 2.778 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 43 | 42 | 97,67 | 1 | 2,33 |
| 3MRGN | 40 | 39 | 97,50 | 1 | 2,50 |
| 4MRGN | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 3 | 6,98 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 40 | 93,02 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 3 | 7,50 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 37 | 92,50 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 3 | 100,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 43 | 2.778 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 42 | 2.778 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 13.794 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 2.778 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 40 | 2.778 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 39 | 2.778 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 13.794 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 2.778 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 2.778 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 3 | 2.778 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 2.778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 13.794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 *Klebsiella pneumoniae*

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 2.778 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 2.778 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 2.778 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 2.778 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

4.2 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|---|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 24 | 2.778 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 23 | 2.778 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 13.794 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 2.778 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 24 | 2.778 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 23 | 2.778 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 13.794 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 2 | 2.778 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

4.3 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.778 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.778 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 2.778 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

4.4 Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 6 | 2.778 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 2.778 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4 | 2.778 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 4 | 2.778 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.778 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 2.778 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 3 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 98 |
| Anzahl Patienten: | 4.182 | Anzahl Patiententage: | 18.276 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 30 | 25 | 83,33 | 5 | 16,67 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 7 | 23,33 |
| VRE | Kolonisationen | 23 | 76,67 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 30 | 4.182 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 25 | 4.182 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 4.182 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 18.276 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 7 | 4.182 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 18.276 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 4.182 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 18.276 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | PÄDIATRISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 16 |
| Anzahl Stationen: | 2 | Anzahl Patiententage: | 5.451 |
| Anzahl Patienten: | 517 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 1 | 25,00 |
| VRE | Kolonisationen | 3 | 75,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 4 | 517 | 0,77 | 0,00 | 0,51 | 1,01 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 517 | 0,19 | 0,00 | 0,13 | 0,25 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 517 | 0,58 | 0,00 | 0,38 | 0,76 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 5.451 | 0,55 | 0,00 | 0,29 | 0,58 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 517 | 0,19 | 0,00 | 0,13 | 0,25 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 5.451 | 0,18 | 0,00 | 0,10 | 0,19 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 517 | 0,19 | 0,00 | 0,13 | 0,25 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 5.451 | 0,18 | 0,00 | 0,10 | 0,19 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | NEUROLOGISCH | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 60 |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Patiententage: | 24.755 |
| Anzahl Patienten: | 6.763 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,67 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 5 | 41,67 |
| MRSA | Kolonisationen | 7 | 58,33 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 12 | 6.763 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 10 | 6.763 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 6.763 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 24.755 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 6.763 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 24.755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 6.763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 24.755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 127 |
| Anzahl Stationen: | 3 | Anzahl Patiententage: | 53.528 |
| Anzahl Patienten: | 10.911 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 34 | 9 | 26,47 | 25 | 73,53 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 13 | 38,24 |
| VRE | Kolonisationen | 20 | 58,82 |
| VRE | Unbekannt | 1 | 2,94 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 34 | 10.911 | 0,31 | 0,21 | 0,44 | 0,49 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 9 | 10.911 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,29 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 25 | 10.911 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,46 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 25 | 53.528 | 0,47 | 0,32 | 0,35 | 0,62 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 13 | 10.911 | 0,12 | 0,03 | 0,15 | 0,29 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 53.528 | 0,13 | 0,04 | 0,20 | 0,35 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 10.911 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,15 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 6 | 53.528 | 0,11 | 0,04 | 0,16 | 0,35 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Art der Station: | KARDIOCHIRURGISCH | Anzahl Beobachtungsmonate: | 67 |
| Anzahl Stationen: | 2 | Anzahl Patiententage: | 27.575 |
| Anzahl Patienten: | 7.452 | | |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 20 | 8 | 40,00 | 12 | 60,00 |
| 3MRGN | 15 | 6 | 40,00 | 9 | 60,00 |
| 4MRGN | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 17 | 85,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 3 | 15,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 12 | 80,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 3 | 20,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 5 | 100,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 20 | 7.452 | 0,27 | 0,15 | 0,21 | 0,28 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 8 | 7.452 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 12 | 7.452 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 12 | 27.575 | 0,44 | 0,35 | 0,40 | 0,44 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 17 | 7.452 | 0,23 | 0,15 | 0,19 | 0,24 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 12 | 27.575 | 0,44 | 0,35 | 0,40 | 0,44 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 12 | 7.452 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 10 | 27.575 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 15 | 7.452 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 6 | 7.452 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 9 | 7.452 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 9 | 27.575 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,35 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 12 | 7.452 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 27.575 | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,35 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 7 | 7.452 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 7 | 27.575 | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,35 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 7.452 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 7.452 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 7.452 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 27.575 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 5 | 7.452 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 5 | 27.575 | 0,18 | 0,00 | 0,10 | 0,20 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 5 | 7.452 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 27.575 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 7.452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 7.452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 7.452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 27.575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 7.452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 27.575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 7.452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 27.575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabelle 4: Raten nach Spezies

4.1 Escherichia coli

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 7.452 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 7.452 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 7.452 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 27.575 | 0,18 | 0,16 | 0,26 | 0,35 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 7.452 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 27.575 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,35 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 7.452 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,15 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 27.575 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,35 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 10 | 7.452 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 5 | 7.452 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 5 | 7.452 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 5 | 27.575 | 0,18 | 0,16 | 0,26 | 0,35 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 8 | 7.452 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 27.575 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,35 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 7.452 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,15 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|----------------|--|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 27.575 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,35 |

4.2 Enterobacter cloacae

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|---------------------------|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

4.3 Citrobacter freundii

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |

4.4 Pseudomonas aeruginosa

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 5 | 7.452 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 7.452 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 3 | 7.452 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 3 | 27.575 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 4 | 7.452 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 4 | 27.575 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,16 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 4 | 7.452 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 2 | 27.575 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 7.452 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 2 | 7.452 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 2 | 27.575 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 3 | 7.452 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 2 | 7.452 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 7.452 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 3 | 7.452 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 3 | 27.575 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 3 | 7.452 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 1 | 27.575 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| VRE | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | BRANDVERLETZTE | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRSA

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | WEANING | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| MRSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| MRSA | Infektionen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| MRSA | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| MRSA | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MRSA | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: VRE

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| Art der Station: | WEANING | | |
| Anzahl Stationen: | 1 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 11 |
| Anzahl Patienten: | 45 | Anzahl Patiententage: | 1.427 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|---------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| VRE | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| VRE | Infektionen | 0 | 0,00 |
| VRE | Kolonisationen | 2 | 100,00 |
| VRE | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|---------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| VRE | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 2 | 45 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| VRE | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 1 | 45 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 1 | 45 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 1 | 1.427 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| VRE | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VRE | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 1.427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erreger-Surveillance, Erreger: MRGN

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| Art der Station: | WEANING | | |
| Anzahl Stationen: | 0 | Anzahl Beobachtungsmonate: | 0 |
| Anzahl Patienten: | 0 | Anzahl Patiententage: | 0 |

Tabelle 1: Erreger-Häufigkeiten

| Erreger | Anzahl Fälle | davon mitgebracht | davon mitgebracht % | davon auf Station erworben | davon auf Station erworben % |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3 + 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Tabelle 2: Infektionshäufigkeiten

| Erreger | Art | Fälle insgesamt | Fälle insgesamt % |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3 + 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 3MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 4MRGN | Unbekannt | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Infektionen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Kolonisationen | 0 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Unbekannt | 0 | 0,00 |

Tabelle 3: Raten

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|-----------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Erreger | Kategorie der Rate | Berechnung | Zähler | Nenner | gepoolter arithm. Mittelwert | 25%-Quantil | Median | 75%-Quantil |
|--------------|--|--|--------|--------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4MRGN | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4MRGN | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Gesamtprävalenz | Anzahl Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Aufnahmeprävalenz | Anzahl mitgebrachte Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Prävalenz MRE-Infektionen | Anzahl Fälle mit Infektion pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenz der auf Station erworbenen Infektionen | Anzahl nosokomiale Infektionen pro 100 Patienten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2MRGN_NEOPÄD | Inzidenzdichte der auf Station erworbenen Infektionen mit auf Station erworbenen MRE | Anzahl nosokomiale Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1000 Patiententage | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System
Erreger-Surveillance im Modul ITS-KISS
Berechnungszeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2020